

# **Zur Pathogenese und Aetiologie der Atheromatose.**

---

INAUGURAL-DISSERTATION  
zur Erlangung der Doktorwürde  
in der  
**Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe**

unter dem Präsidium  
des  
des Herrn Professor  
D<sup>R</sup>. BOLLINGER  
der  
medizinischen Fakultät  
der Ludwig-Maximilians-Universität zu München  
vorgelegt

von  
**Hugo Sternfeld**  
approb. Arzt aus München.

---

**München 1884.**

Kgl. Hof- & Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.



# **Zur Pathogenese und Aetiologie der Atheromatose.**

---

**INAUGURAL-DISSERTATION**  
**zur Erlangung der Doktorwürde**  
in der  
**Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe**

unter dem Präsidium  
des  
**des Herrn Professor**  
**D<sup>R</sup>. BOLLINGER**  
der  
medizinischen Fakultät  
der Ludwig-Maximilians-Universität zu München  
vorgelegt  
von

**Hugo Sternfeld**  
approb. Arzt aus München.

---

**München 1884.**

Kgl. Hof- & Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.



MEINEM LIEBEN VATER

GEWIDMET.



Digitized by the Internet Archive  
in 2026

Die Blutgefäße stellen die Wege dar, auf welchen die Organe ihr Ernährungsmaterial, das Blut, zugeführt erhalten. Diese Nahrungszufuhr muß, wenn die Organe richtig functioniren sollen, eine ununterbrochene sein und wird durch die Continuität des Kreislaufes bedingt, welche von 3 Factoren abhängig ist: Der rythmischen Contraction des Herzens, der Elasticität und Contractilität der Arterien und dem Widerstande der Capillaren. Fehlt einer dieser 3 Factoren oder erleidet er eine Einbuße, so müssen Störungen von Seiten der verschiedensten Organe auftreten; das erkennen wir aus den Folgen des atheromatösen Processus, welcher die Gefäße, zum Teil wenigstens, ihrer Elasticität und Contractilität beraubt. Eine ziemliche Anzahl von Local-Krankheiten (Gangraena senilis, intermeningeale und Hirnblutungen, Aneurysmen sind oft nur zufällige und den Tod zunächst bedingende Ausgänge, die Hauptsache ist die Atheromatose (Buhl)\*.

Zu dieser Erkenntniß konnte man erst in unserem Jahrhundert kommen, da die pathologischen Veränderungen der Gefäßwände früher gar nicht oder nur ungenau bekannt waren; erst seitdem man genaue mikroskopische und chemische Untersuchungen anstellte, konnte man eine klare Vorstellung von den Veränderungen an den Gefäßen und deren Folgen erhalten.

---

\*) Buhl Ber. üb. 280 Leichenöffnngn. Ztschr. f. rat. Med. v. Henle u. Pfeufer 1857. VIII. S. 104.

Ehe wir diese besprechen, müssen wir uns in Kürze das normale Verhalten der Blutgefäße vor Augen führen.

Im Großen und Ganzen ist der Bau derselben, abgesehen von den Capillaren, die nur aus einer zelligen Membran bestehen, ein ziemlich übereinstimmender und unterscheidet sich nur je nach der Natur der Gefäße (Arterie oder Vene) und ihrer Größe, resp. der Weite ihres Lumens.

Nehmen wir eine Arterie mittleren Calibers, so besteht dieselbe ihrem makroskopischen Baue nach aus drei Lagen: der tunica intima oder serosa, der tunica media und der tunica adventitia s. externa.

Die tunica intima ist die schwächste, sie besteht aus einer Lage von Plattenepithel mit polygonalen oder spindelförmigen Zellen, unter welcher eine vorwiegend aus longitudinalen elastischen Fasern bestehende Haut liegt, zwischen diesen findet sich nach Kölliker in den stärkeren Gefäßen noch ein eigentümliches Gewebe, „die streifigen Lamellen“ welches von Henle für umgewandeltes Epithel gehalten wird.

Die tunica media wird gewöhnlich nach Henle als wieder aus 4 Lagen bestehend beschrieben: a) der gefensterten Haut, aus breiten elastischen Fasern, welche netzförmig verbunden sind und längliche Oeffnungen zwischen sich lassen, b) der Längefaserhaut, aus elastischen rhombische Maschen bildenden longitudinalen Fasern, c) der Ringfaserhaut, aus organischen Muskel- und elastischen Fasern zusammengesetzt, d) der elastischen Haut, die fast ausschließlich aus breiten dichtgenetzten elastischen Fibrillen besteht, die zum Teil in die Adventitia, zum Teil in die tieferen Lagen der Media übergehen.

Die tunica adventitia, welche ebenso stark, oder noch stärker als die Media ist, setzt sich zusammen aus elastischen Netzen und besitzt bei größeren Arterien, wenn auch in geringer Menge, organische Muskelfasern.

Alle grösseren Gefässe besitzen wiederum Ernährungsgefässe, (*vasa vasorum sive nutrientia*) die sich hauptsächlich, nach Hyrtl sogar einzig und allein, in der Adventitia ausbreiten; viele Autoren sind anderer Meinung: nach Kölliker enthält die Media der grösseren Gefässe „jedoch nur in sehr geringer Menge und nur in den äussersten Schichten stets“ Gefässe, der grösste Teil derselben jedoch soll wie die *tunica intima* vollständig gefässlos sein.

Neuere Untersuchungen haben jedoch gelehrt, dass die Muscularis der Gefässe sehr reiche *vasa nutrientia* hat und dass diese gewöhnlich bis zur Grenze zwischen äusseren und mittleren Drittel reichen; einzelne Aeste jedoch noch tiefer, manchmal bis an die Intima, nur selten sieht man eine Capillare noch in die Intima hineingehen, aber es kommt an grösseren Arterien entschieden vor. (Koeft<sup>er</sup>\*).

Von den Erkrankungen der Gefässwände ist wohl keine so häufig wie die von Virchow mit dem Namen Endoarteritis deformans, von Lobstein, der zuerst eine genaue Arbeit über diesen Gegenstand lieferte, Arteriosclerose, gewöhnlich aber unter dem Namen Atheromathose (von ἀθήρη die Grütze wegen der Aehnlichkeit des Atherombreies mit einem Grützbrei) bekannte Veränderung der Intima der Gefässe.

Der pathologisch-anatomische Befund dieser Krankheit wurde von den meisten Autoren fast in gleicher Weise angegeben und stellt sich ungefähr in folgender Weise dar: Die Innenfläche der Arterienwand ist nicht, wie im normalen Zustande, vollständig glatt und glänzend, sondern bald auf grössere Strecken hin ungleichmässig verdickt, bald zeigt sie theils durchscheinende weiche (gallertartige) theils opake gelblich weisse (halbknorpelige) Erhabenheiten; dazwischen ist an einigen Stellen das Epithel verloren gegangen und die Oberfläche in Folge dessen rauh und uneben, teilweise von Fibrinniederschlägen

---

\*) Köster üb. d. Struct. d. Gefässwde. Berl. kl. W. S. 1875. S. 588.

aus dem Blute bedeckt, an anderen die Intima in Form von Pusteln emporgehoben oder sogar anscheinend mit Geschwüren bedeckt, dies ist der Fall, wenn die Pusteln geplatzt und ihr Inhalt, der atheromatöse Brei, frei zu Tage liegt; zuweilen findet man auch schiefergraue oder schwarz pigmentirte Flecke, welche als vernarbte Stellen zu betrachten sind.

Mikroskopisch bestehen diese Verdickungen aus Bindegewebsslamellen zwischen welche zahllose junge Zellen verteilt sind, nach Langhans\*) sind es theils stern- theils rundförmige Zellen, während sich in der normalen Intima nur sternförmige finden: diese Zellen lassen eine Vergrößerung und Teilung der Kerne erkennen und neben den Kernen befinden sich feinste Fetttröpfchen abgelagert, wo diese zahlreich geworden, bilden sie dichte und große Körnchenzellen oft von ganz sternförmigem Bau, mit anastomatischen Fortsätzen versehen, diese confluiren zu einer Herde, bilden Körnchenkugeln und zerfallen in einen Körnerbrei, aus dem sich größere Fetttropfen und Cholesterinkrystalle ausgeschieden haben und in dem sich dann Kalksalze ablagern können; auf diese Weise werden die atheromatösen Herde gebildet; dieser Vorgang findet jedoch nur bei den halbknorpeligen Platten statt, bei den gallertigen Flecken ist die Bildung dieser Körnchenzellen sehr unvollständig und es wird nur wenig Fett entwickelt, die Fettkörperchen liegen daher zerstreut in der Grundsubstanz (Virchow\*\*).

Ueber die Ursachen und Entstehungsweise dieser Veränderungen herrschen die verschiedensten Meinungen.

Schon Monro hat eine ziemlich gute Beschreibung des Atheroms gegeben; derselbe leitet es von einer Entzündung ab und hält es für die Ursache der Arterienverengung; später haben Meckel, Morgagni und Haller genauere Beschreibungen desselben geliefert. Aber den Gefäßerkrankungen wurde erst

---

\*) Langhans Beitrag z. norm. u. path. Histol. d. Arter. Virch. Arch. 36; 1866.

\*\*) Virchow Ges. Abhandlgn. Frankfurt 1855 S. 504.

dann grössere Aufmerksamkeit geschenkt, als man anfangs, die Gefäß-Entzündung für die Ursache des Fiebers zu halten, eine Lehre, die viele Jahre hindurch die herrschende; später hielt man jedoch an der Möglichkeit einer Arterien-Entzündung noch fest und betrachtete dieselbe als die Ursache der Atheromatose.

Der Hauptvertreter dieser Ansicht, Tiedemann,\*) hält die weissen Flecken und die Auflagerungen in den Arterien für eiweisartige Ausschwitzungen und Erzeugnisse eines krankhaften Reizzustandes der Arterien.

Dem gegenüber erklärt Rokitansky\*\*) den atheromatösen Process für die Folge einer Auflagerung aus dem Blute ausgeschiedener Stoffe auf die innere Gefäßwand; nach seinem Urtheil ist diese Auflagerung die häufigste Arterienerkrankung und die gewöhnlichste Ursache der spontanen Aneurysmen; sie bestehe in der Ausscheidung eines Proteinkörpers aus dem Blute, welches auf der Innenfläche der Arterien erstarre und mehrfachen Metamorphosen unterliege, denen sich wichtige consecutive Erkrankungen der Ringfaserhaut und der Zellscheide der Adventitia beigesellen (Excedirende Anbildung innerer Gefäßhaut). Diese Metamorphosen sollten bestehen in der Umwandlung zu Gewebe, in der Umwandlung zum atheromatösen Process, welche gewöhnlich die vorhergehende Bildung befallt, und in der Verknöcherung. Rokitansky spricht sich nun ganz entschieden gegen die entzündliche Natur des Processes aus und sucht seine Ansicht durch seine Lehre von der arteriellen Krase zu begründen; auf die weiteren Details, welche dieser Forscher als Gründe gegen die Entzündungstheorie und zum Beweise für die Richtigkeit seiner Lehre

---

\*) Tiedemann v. d. Vereng. u. Verschl. der Pulsad. i. Krankhthn. 1843 S. 200.

\*\*) Rokitansky Lehrb. d. path. Anatomie 1844 und: Ueber die wichtigsten Krankhthn. d. Art. u. Ven. in Denkschrift d. Wiener Akad. d. Wiss. Bd. IV, 1852, S. 12 & 13.

angibt, können wir, um nicht zu weitläufig zu werden, verzichten.

Der Engländer Crisp \*) erhob sich zuerst gegen diese Ansicht, er glaubt, daß den Veränderungen ein congestiver, wenn nicht entzündlicher Zustand der Häute vorangeht und hält die Veränderungen für Entzündungsproducte; er behauptet schon, daß die Ablagerungen sich immer unter der feröfen Haut fänden.

Widerlegt wurde die Ansicht Rokitanskys in Deutschland erst durch Risse \*\*), welcher nachwies, daß auf der veränderten Intima der Gefäße, selbst wenn die Veränderungen in der Tiefe schon sehr weit vorangeschritten waren, das Epithel über den Stellen vollständig erhalten war. Risse hält die Veränderungen der Intima für eine wahre Hypertrophie mit Ausgang teilweise in Verfettung teilweise in Verknöcherung. Später liefs auch Rokitansky \*\*\*) seine frühere Ansicht wenigstens zum Teil fallen und erklärt die Verdickung der Intima für eine „zuweilen jedoch bei weitem nicht immer durch Entzündung d. i. Aufnahme von Exudat veranlaßte Bindegewebsneubildung.«

Die meisten der damaligen Autoren hielten alle an der Innenwand der Gefäße beobachteten Veränderungen für den Ausdruck einer gemeinsamen (dyscrasischen) Ursache und achteten daher nicht auf die feineren anatomischen Unterschiede und deren verschiedene Entstehungsweise; erst Virchow †) gelang es, wie in allen Gebieten der pathologischen Anatomie, so auch hier, auf Grund genauer Forschungen sowie mittelst des Experimentes mehr Klarheit in dieses Gebiet zu bringen. Er

---

\*) Crisp Krkhtn. d. Blutgef. Berl. 1849 (aus d. Engl. treatise on the struct. of the bloodvess. London 1847).

\*\*) Risse Observ. quaed. d. art. stat. norm. atq. path. Diss. inaug. Regiomont. 1853.

\*\*\*) Rokitansky Lehrb. d. path. Anat. 1855.

†) Virchow Cellularpath.

unterscheidet zwei, ihrer Entstehung nach sehr verschiedene, ihrem Endresultate nach aber sehr analoge Prozesse an den Gefäßen.

1) Die einfache Fettmetamorphose, reines Vorstadium, wo die vorhandenen Elemente unmittelbar in fettige Degeneration übergehen und zerstört werden, wodurch die fettige Ufur entsteht

2) Die entzündliche (active) Degeneration, der ein Stadium der Reizung (entsprechend dem Stadium der trüben Schwellung an den Organen) vorangeht (Endoarteritis) und die analog ist den Veränderungen am Herzen (Endocarditis).

Beide Prozesse können natürlich zugleich vorkommen, beide werden gewöhnlich auch unter dem Namen des atheromatösen Processes beschrieben, obwohl die einfache Fettmetamorphose gar nichts mit demselben zu thun hat, doch ist es sehr schwer, eine bestimmte Grenze zwischen beide Prozesse zu ziehen, um so mehr, als durch die letztere in Folge der Entblösung der Intima von Epithel diese leichter zu entzündlichen Störungen disponirt; beim eigentlich atheromatösen Process jedoch handelt es sich nach Virchow von vorne herein um eine parenchymatöse Entzündung. Es entsteht eine hypertrophische Wucherung des Bindegewebes der Intima, welche mit einer Lockerung der bindegewebigen Grundsubstanz beginnt, wobei sich zugleich die Bindegewebskörperchen der Intima vergrößern, auf diese Weise kommt es zur Bildung gallertartiger Verdickung und halbknorpeliger Platten; erstere kann fettig degeneriren und so gleichfalls eine fettige Ufur entstehen, während aus letzterer der eigentlich atheromatöse Process hervorgeht; in beiden Fällen sind jedoch die Bindegewebskörperchen als Ausgangspunkt der fettigen Entartung zu betrachten, während nach Langhans sowohl Zellen als Inter-cellularsubstanz, bald diese, bald jene zuerst der Fettentartung anheimfallen.

Traube \*) leitet die atheromatösen Ablagerungen von einer Arteriosclerose ab (worunter er nicht wie Lobstein die Veränderungen des Aortenbogens, sondern den Vorgang selbst, dem diese Veränderungen ihre Entstehung verdanken, versteht), die durch mechanische Momente bedingt sei und in der Verlangsamung des Blutstromes ihren Grund habe; findet eine solche durch irgend welche Ursachen statt, so häufen sich die den peripheren Teil der Blutbahn einnehmenden Lymphkörperchen an der Innenfläche des Gefäßes an, wie dies auch in entzündeten Teilen (Conheim) der Fall ist, durchsetzen die Epithelschichte und gelangen in dem Lacunen- und Kanalsystem das sich zwischen den gestreiften Lamellen befindet bis in die Nähe der gefensterten Haut und verwandeln sich hier in spindel- und sternförmige Zellen, welche als Anfang einer Bindegewebsneubildung zu betrachten sind. Ihre Ernährung erhalten dieselben auf dem gleichen Wege auf dem sie eingewandert sind; wird dieselbe unzureichend, so tritt regressive Metamorphose ein.

Nach den Untersuchungen von Koester \*\*) beruht die Endarteritis auf Sclerose der Intima, welche er zum Teil nur als Hypertrophie zum Teil als chronische Entzündung auffaßt, je nachdem die regressive Metamorphose früher oder später eintrete, stellten sich die endarterischen Veränderungen verschieden dar, immer aber finde man, besonders in den innersten Schichten kleine Rundzellen oder Kerne, wie sie in der normalen Wandung nicht vorkommen, welche er der Mehrzahl nach für eingewanderte farblose Blutkörperchen hält, die aber erst dann in die Gefäßwände eingedrungen seien, nachdem dieselben schon Veränderungen erlitten hätten.

Koester \*\*\*) hingegen nimmt, gestützt auf das anatomische

\*) Traube Berl. klin. W. S. 1871 u. Ges. Abhdlgn. z. Path. u. Phys. III. Bd. 1878.

\*\*) Koester Pathog. d. Endart. Centrbl. f. d. med. W. 1874 S. 699.

\*\*\*) Koester Berl. klin. W. S. 1867 S. 454.

Verhalten der Gefäße (siehe oben) an, daß alle entzündlichen Veränderungen der Gefäße hauptsächlich von den vasa vasorum ihren Ausgang nehmen müßten und führt als beweisend das Vorkommen einer gleichen Entzündung der Media an \*), die mit der Endarteritis gewöhnlich im Zusammenhange stehe, sowie die Beobachtung, daß Endarteritis nur an den Gefäßen vorkömmt, die von vasa nutrientia versorgt werden; daraus erkläre sich auch das häufige Vorkommen der Endarteritis an den Gehirngefäßen, wo selbst minimal kleine Arterien noch mit vasa nutrientia versorgt sein sollen; als dritten Beweis führt er die auch von früher genannten Autoren bestätigte Thatfache an, daß die Zelleninfiltrationen der Intima immer in der Tiefe nahe der Muscularis liegen und erst von hier aus nach dem Endothel zu vorrücken. Die Verdickungen der Intima entzündeten demnach durch eine chronische Entzündung wobei sich die Zellen der Intima vergrößern, feinkörnig werden und es selbst zur Kernwucherung bringen, es tritt dann fettige Degeneration ein, während die bindegewebige Grundsubstanz sich verdichtet, so daß wir hier also wie bei anderen chronischen Entzündungen als Ausgangspunkt derselben die Gefäße (Capillaren) betrachten müssen, wenn auch eine Beteiligung des Gewebes an der Gewebsneubildung stattfindet.

Auf den gleichen Widerstreit der Meinungen, wie wir ihn bezüglich der Pathogenese der Atheromatose finden, stoßen wir auch bezüglich der Aetiologie bei den verschiedenen Autoren.

Wenn wir zunächst von den im Anfang bis in die Mitte unseres Jahrhunderts herrschenden Krasenlehren absehen und zunächst nur auf die in den neueren Schriften angeführten ätiologischen Momente Rücksicht nehmen, so ist in erster Linie das Alter als Gelegenheitsursache zu berücksichtigen, einige Autoren wollen die Atheromatose sogar als normale (physiologische) Altersveränderung ansehen; dem stehen verschiedene

---

\*) Koester Berl. kl. W. S. 1875 S. 322.

Bedenken entgegen und scheint sich dies einerseits aus dem Umfande zu erklären, daß gewöhnlich alle an den Arterienwandungen vorkommenden Veränderungen unter dem Namen der Atheromatose verstanden werden so die Verkalkung der peripheren Arterien; diese wird sogar gewöhnlich als ein Merkmal des atheromatösen Processes betrachtet, was jedoch wie Virchow\*) nachwies nicht ganz richtig ist. Die Verkalkung (Petrification) ist im Gegensatze zum atheromatösen Process und dessen Ausgängen Verkreidung und Verknöcherung, ein passiver Vorgang eine wirkliche Atrophie und hat ihren Sitz in der Muscularis (die Faferzellen der Ringfaserhaut werden in Kalkspindel umgewandelt), während die Atheromatose wie wir gesehen haben wahrscheinlich mit Entzündung im Zusammenhange steht und ihren Sitz zunächst in der Intima hat wenn sie auch später meist auf die Media und selbst auf die Adventitia übergreift; die einfache Verkalkung hat also gar keinen notwendigen Zusammenhang mit einer Entzündung der Arterien; sie kommt am gewöhnlichsten unter Verhältnissen vor, wo überhaupt eine Neigung zu Verkalkung besteht, im höheren Lebensalter, wenn wir uns fragen, warum dennoch die Atheromatose häufiger im vorgeführten Alter, am häufigsten zwischen dem 40. und 60. Lebensjahre vorkommt, so müssen wir mit Wunderlich\*\*) annehmen, daß alle chronischen Veränderungen an den Gefäßen sich ungleich häufiger im vorgerückten Alter finden, wenngleich sie im jugendlichen Alter durchaus nicht ausgeschlossen sind und viel häufiger als man gewöhnlich annimmt gefunden werden, andererseits ist auch zu berücksichtigen, daß im Anfang der Erkrankung die Veränderungen nur geringe sind und deshalb nicht beachtet werden, während die meist schon weit vorgeschrittenen Veränderungen, die wir bei Section älterer Leute finden und welche wir auch klinisch nach-

---

\*) Virchow Cellularpath. S. 453.

\*\*) Wunderlich sp. path. Anat. Stuttg. 1853 II S. 430.

zuweisen im Stande sind, oft schon sehr frühzeitig ihren Anfang genommen haben können, wie aus den Untersuchungen von Crisp, sowie aus den von mir gemachten Beobachtungen hervorzugehen scheint. Crisp hat während 2 Jahre die Arterien der Brust- und Bauchhöhle in 100 Fällen der verschiedensten Krankheiten untersucht und häufig das Vorkommen weißlicher undurchsichtiger Ablagerungen an den Ursprungsstellen der Intercoastalarterien wahrgenommen; 12 von diesen Fällen (Fall 1, 4, 5, 15, 24, 25, 26, 36, 39, 46, 50, 51) kamen bei Individuen vor, welche das 26. Lebensjahr noch nicht erreicht hatten und es ist nach der angegebenen Beschreibung, nach dem Sitze der Veränderungen und dem angegebenen mikroskopischen Befund kaum zweifelhaft, daß wir es hier mit den Anfängen des atheromatösen Processes zu thun haben, unter diesen 100 Fällen befanden sich hinwiederum 7 Fälle (Fall 20, 32, 37, 67, 80, 88, 91) von Individuen über 50 Jahren darunter eine Frau mit 84 Jahren, in denen die Arterien entweder auffallend wenig oder gar nicht verändert waren. Aehnliche Beispiele finden sich mehrere in der Literatur: Andral beobachtete Atherom der Aorta bei einem 8jähr. Knaben (Weber\*); ein solcher findet sich auch bei Crisp (Fall 50) Buhl fand unter 280 Leichen 28 welche an Atheromatoze zu Grunde gegangen sind, darunter ein 13jähriges Mädchen bei dem durch Platzen eines Aneurysmas plötzlich der Tod eintrat, Billroth\*\*) berichtet über einen Fall von einem 22jährigen Manne, der an Gangrän des Fusses gestorben und bei dem die Section ausgedehnte Atheromatose fast aller Arterien nachwies. Risse\*\*\*) beobachtete gleichfalls Atheromatoze 2 mal bei Mädchen von 23 Jahren, ja es ist ein Fall in der Literatur verzeichnet †), in welchem bei einem Foetus

\*) Weber Krkhtn. d. Art. S. 169 in Pitha Billr. Chir.

\*\*) Billroth allg. Chr. Berlin 1882. S. 763.

\*\*\*) Risse l. c. S. 18.

†) Klin. d. Geburtsh. u. Gyn. von Chiari, Braun u. Späth. Wien, 1855  
I. S. 109.

beide Nabelarterien atheromatös gefunden wurden. Im Gegensatz zu diesen stehen die von gewissenhaften Autoren berichteten Fälle wo selbst bei sehr hochbetagten Menschen die Arterien vollständig normal gefunden wurden, so der Harvey'sche bei einem 150jährigen (?) Manne, der von der Amme Washingtons bei einer angeblich 160jährigen (?) Frau, ein Fall von Duchek bei einem 98jährigen und mehrere Fälle von Bamberger bei über 90 Jahre alten Leuten (Lebert \*).

Wir haben diese Fälle absichtlich genauer angeführt, weil, wie schon erwähnt, die Atheromatose so häufig für eine ausschließliche Altersveränderung und fogar für normal angesehen wird, mit demselben Rechte könnten wir dann die Gangränä fenilis oder die Cataract für normal halten, weil der größte Teil der von diesen Krankheiten Befallenen dem höheren Lebensalter angehört; der Involutionsproceß ist also blos ein die Entwicklung der Atheromatose in hohem Grade begünstigendes Moment.

Hinsichtlich des Geschlechtes ist kein wesentlicher Unterschied, das männliche ist höchstens etwas häufiger befallen stets aber früher, bei den von Buhl erwähnten 28 Fällen ausschließlich des 13jährigen an Aneurysma verstorbenen Mädchens waren 10 Weiber, wovon 6 auf die 70er Jahre trafen, während die 17 Fälle von Männern sich auf die 30—70er Jahre ziemlich gleichmäÙig mit einem geringen Vorwiegen der 60er verteilen; meine Beobachtungen stimmen, wie wir sehen werden, so ziemlich mit diesen überein.

Häufig findet man, besonders in älteren Lehrbüchern, die Angabe, daß die chronischen Erkrankungen an den Arterien häufiger bei wohlgenährten Personen vorkommen, als bei marastischen, woran man die Annahme knüpfte, daß die Ernährungsweise von Einfluß sein müsse, doch mit Unrecht. Blos die einfache Fettdegeneration (welche allerdings auch als

\*) Lebert *Krkh. d. Blut- und Lymphgef. i. Virch. Hdbch. d. Path. u. Ther.* V 2 S. 352.

Form der Atheromatose gewöhnlich gilt) ist bei solchen Leuten wie an den übrigen Organen, so auch an den Arterien häufiger während der eigentliche atheromatöse Process geradezu die Ursache des frühzeitigen Marasmus ist.

Dafs die Ernährungsweise, besonders der übermäfsige Genufs von Amylaceen Zucker u. dgl. die Ursache des atheromatösen Processes sein könne, dafür wurde das Vorkommen desselben bei Tieren als Beweis angeführt, doch ist derselbe nicht stichhaltig und wäre vielmehr geeignet das Gegenteil zu beweisen, denn wie Bollinger \*) gezeigt hat, ist die Atheromatose bei Pflanzenfressern, trotzdem dieselben unter gewissen Verhältnissen (Mästung) sehr grosse Mengen von Amylaceen genießen und obwohl sonst die fettige Entartung und Verkalkung entzündlicher Producte insbesondere beim Rinde viel häufiger vorkommen als beim Menschen, gar nicht zu Atheromazose disponiert, blos bei Pferden ist dieselbe sehr häufig, hier kann jedoch von einem Einflufs der Ernährung nicht die Rede sein, denn die Atheromatose der Pferde ist, wie der gleiche Autor nachgewiesen hat, gewöhnlich parasitär, d. h. sie wird durch einen Parasiten (*Strongylus armatus* = Pallidfadewurm) bedingt, daher ihr Name Endoarteritis verminosa. Die Ernährung ist also hier wohl die Ursache der Erkrankung aber nur indirect, indem mit der Nahrung die jugendlichen Individuen des Parasiten in den Darm und von hier in die Gekrösarterien — wo die Atheromatose bei Pferden am häufigsten gefunden wird, — gelangen und durch ihre Anwesenheit gleichsam als Fremdkörper, die Veranlassung zur Entzündung abgeben; auch die vereinzeltten Beobachtungen über Atherom an andern Tieren (Rind, Hund) sind nach Bollinger nicht wie die Atheromatose des Menschen eine spontane Erkrankung, sondern wahrscheinlich secundärer Natur.

Als sicher wird fast von allen Autoren angenommen, dafs

---

\*) Bollinger d. Kolik d. Pferde u. d. Wurmaneur. d. Eingeweideart. München 1870.

der chronische Alkoholismus wenigstens für die Fälle in früheren Jahren zu beschuldigen ist, und daß sich der Process bei Potatoren viel früher und schneller entwickelt. Traube führt dies auf mechanische Momente zurück, wovon später noch die Rede sein soll; doch gegen die Annahme, daß der chron. Alkoholismus überhaupt die häufigste Ursache der Atheromatose sei, spricht die Thatsache daß die Krankheit bei Weibern, bei denen doch das Potatorium bei uns wenigstens kein so häufiges Laster ist, als bei den Männern, fast ebenso häufig, wenn auch meist erst in späteren Jahren und im geringeren Grade vorkommt. Wir können demnach den chron. Alkoholismus nur als prädisponierendes Moment für die Fälle der Erkrankung in jüngeren Jahren ansehen.

Von allgemeinen Ernährungsstörungen werden besonders Gicht und Rheumatismus mit der Atheromatose in Beziehung gebracht. Gicht und Rheumatismus haben eine Aetiologie, sagt Rindfleisch\*) und werden daher auch häufig nebeneinander gefunden; daß aber die im Blute zurückgehaltenen harnsauren Salze, wie man glaubte, die Ursache für die Erkrankung (Entzündung) der Gefäße abgeben sollen, ist durch Virchow\*\*) widerlegt worden.

Viel wahrscheinlicher ist eine Beziehung zum Rheumatismus worauf uns die vollkommene Analogie der bei der chron. Endarteritis bestehenden Veränderungen mit denen bei Endocarditis besonders der Klappen beobachteten hinweist; vielleicht haben wir es hier nur mit einer direkten Fortsetzung des Processes von dem Herzen nach den Arterien oder umgekehrt zu thun. Virchow hat wenigstens nachgewiesen, daß kein wesentlicher Unterschied zwischen den Produkten der Endocarditis und denen der Endoarteritis besteht; letztere unterscheidet sich von ersterer nur durch ihren acuten Verlauf und ihre größere Neigung zur Hervorbringung papillärer oder warziger

\*) Rindfleisch Lehrb. d. path. Gewebl. Leipz. 1871. S. 183.

\*\*) Virchow Hdbch. d. sp. Path. u. Ther. I. 241.

Excrescenzen, die sich aus dem größeren Gefäßreichthum und der größeren Lockerheit des Bindegewebes erklären läßt. Es kann uns das auch nicht Wunder nehmen, wenn wir uns daran erinnern, daß das Endocard, wie Luschka<sup>\*)</sup>) nachwies, in seinem anatomischen Bau „nur mit den anders gewordenen Zwecken adäquaten Modifikationen“ — ganz den Gefäßen (nicht der Intima wie man früher glaubte) entspricht.

Auffer Gicht und Rheumatismus wurde auch Syphilis für eine Ursache der Atheromatose gehalten; besonders englische Autoren (Aitken, Wilks, Albutt) haben dies behauptet, und es wurde vielfach die Frage diskutiert, ob es eine spezifischluetische Endarteritis gäbe, oder ob dieselbe unter den allgemeinen Begriff der Atheromatose einzureihen sei. Heubner<sup>\*\*)</sup>) hält die luetische Endoarteritis für einen von der Atheromatose in seiner Entstehung sowohl, als seinem Vorkommen, seiner Dauer und seinen Folgen ganz verschiedenen Prozeß, während Köster<sup>\*\*\*)</sup>) die Spezifität des Prozesses negiert, „ohne deshalb leugnen zu wollen, daß luetische Individuen besondere Disposition zu Veränderung an den Gefäßen besitzen.“

Von lokalen Erkrankungen wurden besonders chronische Nierenleiden mit dem Vorkommen der Atheromatose in Zusammenhang gebracht; schon im Jahre 1845 wies Seitz<sup>†)</sup>) auf das Zusammenvorkommen von Nieren- und Gefäßkrankheiten hin. Gull und Sutton, welche nach dem genannten Autor zuerst wieder ihre Aufmerksamkeit auf dieses eigenthümliche Zusammentreffen lenkten, nahmen als Ursache der Veränderungen eine Allgemeinkrankheit an, die sie arterio-capilläre Fibrosis nannten, und welche sie auch für die Ursache des M. Bright hielten<sup>††)</sup>);

\*) Luschka, Das Endoc. u. die Endocrd. in Virch. Arch. IV. 1872. S. 171.

\*\*) Heubner, Die luet. Erkrkgn. d. Hirnart. Leipzig 1874.

\*\*\*) Köster, Berl. Klin. W. S. 1876. S. 454.

†) Seitz, Ueb. di Zusamm. Vork. d. Verknöch. d. Art. m. Krkht. d. d. Harnwkgz. i. Roser u. Wunderlich Arch. f. phys. Hlkr. IV. 1845. S. 53.

††) Buhl, Mittheilgn. aus d. path. Inst. in München. Stuttgart 1878.

Buhl hingegen zeigte, daß unter der genannten Krankheit nichts anderes als die Atheromatose gemeint sein könne, welche meist in Begleitung von Hypertrophie des Herzens und Granularschwund der Nieren (senilen Schwund) angetroffen werde, welche jedoch nicht, wie Gull und Sutton glaubten, als die Ursache sondern gerade umgekehrt als die Folgen der genannten Veränderungen an Herz und Nieren zu betrachten sei. Daß ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen den genannten Krankheiten bestehen müsse, ergab auch die Statistik. Buhl hat bei Granularschwund der Nieren und linksseitiger Herzhypertrophie 41,8% Fälle von Atherom der Aorta berechnet; ein ähnliches Resultat fand Löwenfeld\*): von 37, zur Obduktion gekommenen Fällen mit ausgebildetem Atherom war 13 mal chron. M. Bright (darunter ein sehr hochgradiger Fall von Atheromatose bei einem 27 jährigen Mädchen) gleichzeitig vorhanden, damit stimmen auch die von mir berechneten Zahlen so ziemlich überein.

Indem wir diese häufige Koinzidenz zu erklären suchen, kommen wir auf die mechanische Entstehungsweise der Atheromatose zu sprechen.

Daß mechanische Momente im Spiele seien wird fast von allen Autoren angenommen: Rokitsansky führt die Massenzunahme der Intima auf eine „besonders durch lokale und allgemeine mechanische Momente angeregte und unterhaltene funktionelle Anstrengung der Arterien“ zurück; d. h. er hält ebenso wie Rindfleisch und Virchow den mechanischen auf die Wandung wirkenden Reiz nur für die Mitursache namentlich für das lokalisirende Moment; als Beweis dafür dient das Vorkommen ähnlicher Veränderungen in den Venen bei lang andauerndem gesteigerten Druck sowie der Umstand, daß auch bei der chron. Endocarditis immer die Stellen zuerst erkranken die der Reibung und Zerrung am meisten ausgesetzt sind

---

\*) Löwenfeld, Ueber d. ath. Proc. d. Aort. Wien med. W. S. 1877 Nr. 41 u. 43.

(Virchow) Nach Fränkel<sup>\*)</sup> ist diese Blutdrucksteigerung einerseits durch allzu opulente Lebensweise, verknüpft mit Trägheit der Muskulatur, oder durch einfache sitzende Lebensweise und durch Störungen im Pfortaderkreislaufe, andererseits durch chron. Alkoholismus nebst abnormen Muskelanstrengungen bedingt. Auch die ziemlich häufig gemachte Beobachtung von Atherom in den Lungenarterien bei hochgradiger (besonders angeborener) Stenose der Mitralis liefs die Blutdrucksteigerung als die Entstehungsursache des Processes annehmen. Nach Traube ist jedoch nicht diese an und für sich und ebensowenig die Reibung und Zerrung der Arterien wie andere glauben, sondern die Verlangsamung des Blutstromes wie wir fahen die Hauptsache; dies beweise das häufige Befallenwerden der Hirngefäfsse, im Gegenfatze zur Carotis, wo die Verlangsamung der Blutbewegung in einer Spannungsverminderung ihren Grund habe; das Gleiche könne aber auch durch eine Spannungserhöhung bewirkt werden, was aus dem Vorkommen der Atheromatose im Pulmonalarterienfystem bei Stenose des oft. ven. sin. hervorgehe; gewöhnlich finde sich dieselbe jedoch im Aortensysteme und sei hier als die häufigste Ursache das Potatorium anzusehen. Der Alkohol bewirkt nämlich eine Kontraktion der kleineren Arterien, wodurch die Widerstände für das Aortensystem wachsen; die an den Arterien wahrnehmbare Spannungserhöhung würde dann auch eine Verlangsamung des Blutstromes bedingen. Wo wir keinen Grund für die Spannungserhöhung im Aortensystem finden können, da ist die Arteriosklerose nach Traube<sup>\*\*)</sup> wahrscheinlicher Weise nur ein reaktiver Vorgang und gehört als solcher in eine Kategorie mit der Herzhypertrophie.

Wenn wir, wie gewöhnlich angenommen wird, die mechanischen Momente nur als Hilfsursache betrachten wollen, so

---

<sup>\*)</sup> Fränkel, Ueber Scler. d. Aort.-Syst. u. der. Bhdlg. Deutsch. med. W. S. 1881. Nr. 50.

<sup>\*\*)</sup> Traube, Beitr. z. Path. u. Phys. III. Bd. S. 161.

müssen wir nach einer andern primären Entstehungsursache suchen und diese glauben viele in einer angeborenen Disposition, in einer sich vererbenden Schwäche und verminderten Widerstandsfähigkeit der Arterien gefunden zu haben (Weber, Billroth).

Auch chronische Metall-Intoxikationen (Quecksilber-, Blei-, Kupfervergiftung) sollen eine Prädisposition für Gefäßerkrankungen abgeben und ließe sich das auf zweierlei Weise erklären. Entweder aus der hochgradigen Anämie, welche gewöhnlich die Folge chron. Metallvergiftungen ist und welche nach Virchow die häufigste Veranlassung für die Fettentartung der Intima ist, wodurch diese, wenn das Epithel verloren gegangen, dann leichter zu entzündlichen Vorgängen disponiert oder aus der in Folge gestörter Innervation eintretenden Aenderungen des Cirkulationsapparates, welche sich durch eine auffallende Spannung und Verlangsamung des Pulses zu erkennen gibt.

Vielleicht sind auch atmosphärische Einflüsse vorhanden; bis jetzt gibt uns die Wissenschaft wenig Hilfsmittel an die Hand, dies zu entscheiden; doch scheint das ungleich häufigere Vorkommen von Atheromatose in manchen Ländern, z. B. in England, dafür zu sprechen.

Im Anschluß an die von den verschiedenen Autoren gemachten Erfahrungen bezüglich der Aetiologie der Atheromatose möchte ich mir erlauben, die Ergebnisse meiner Beobachtung, welche ich während zwei Jahren in der medicinischen Poliklinik des Herrn Professor Seitz, dem ich hiemit zugleich für die Ueberlassung des Materials besten Dank ausspreche, gemacht habe, soweit mir dieselben in aetiologischer Hinsicht von Wichtigkeit zu sein schienen, mitzuteilen. Es ist hiebei zu bemerken, daß die Diagnose Atheromatose nur dann in meine Statistik aufgenommen wurde, wenn sich die bestehenden Störungen, sei es, daß sie localer oder allgemeiner Natur waren, als abhängig oder direkt durch die Atheromatose bedingt, angenommen werden konnten, d. h. folgende Symptome darboten: Hypertrophie des linken Ventrikels (Herzspitze nach

unten und aufsen) bei normaler Beschaffenheit der Klappen, Accentuierung des zweiten Tones und metallischer Klang desselben, Verspätung des Pulses, Völle und Dehnung desselben (zum Unterschied von dem schleudernden Puls bei permanenter Aorteninsuffizienz); die subjektiven Beschwerden waren verschieden je nach dem Alter der Patienten und wollen wir hier als außer Belang übergehen.

Es ist klar, daß hiebei nur die ausgeprägten Fälle von Atheromatose gemeint sein können, da die geringeren Grade derselben, fettige Entartung, gallertartige Erweichung und halb knorpelige Ablagerungen, zu wenig oder gar keine Anhaltspunkte für die Diagnostik darbieten.

Von circa 9000 Patienten wurde die Diagnose Atheromatose bei 206 ( $2\frac{1}{3}\%$  aller Erkrankungen) als feststehend angenommen, welche sich auf das Alter und Geschlecht in folgender Weise verteilen:

| zwischen | Männer | Weiber |
|----------|--------|--------|
| 20—29    | 1      | —      |
| 30—39    | 5      | 1      |
| 40—49    | 9      | 5      |
| 50—59    | 38     | 23     |
| 60—69    | 42     | 31     |
| 70—79    | 24     | 47     |
| 80—89    | 3      | 6      |
| 90—99    | —      | 1      |

Summa 122 M.    84 W.

Wir ersehen aus dieser Tabelle, daß beide Geschlechter so ziemlich in gleicher Weise von der Krankheit befallen werden, indem das Verhältnis von 122 : 84 ungefähr dem Gesamtverhältnis entspricht (von den in der Poliklinik behandelten Personen waren ungefähr  $\frac{2}{3}$  Männer und  $\frac{1}{3}$  Weiber), daß aber beim weiblichen Geschlechte unverhältnismäßig mehr Erkrankungen auf das höhere Lebensalter treffen.

Hochgradiges Potatorium (als gewöhnliche Potatoren sind

wohl die meisten der in Behandlung gekommenen Fälle zu betrachten,) konnte bei 9 Fällen ganz bestimmt nachgewiesen werden und waren von diesen:

| zwischen | Männer | Weiber    |
|----------|--------|-----------|
| 30—39    | 2      | —         |
| 40—49    | 1      | 1         |
| 50—59    | 4      | —         |
| 60—69    | —      | 1         |
| <hr/>    |        |           |
| Summa    | 7 M.   | 2 W. = 9. |

Hier zeigt sich also wieder, daß das männliche und jüngere Lebensalter vorwiegend betroffen sind und ebenso in den 9 Fällen, in welchen Apoplexie eintrat; von diesen waren

| zwischen | Männer | Weiber    |
|----------|--------|-----------|
| 30—39    | 2      | —         |
| 40—49    | 2      | 1         |
| 50—59    | 1      | 1         |
| 60—69    | —      | 1         |
| 70—79    | 1      | —         |
| <hr/>    |        |           |
| Summa    | 6 M.   | 3 W. = 9. |

Gicht und Rheumatismus waren nur 2 mal als Komplikation angeführt und ist diese geringe Zahl so zu erklären, daß die meisten Fälle von Rheumatismus mit Herzfehlern kombiniert waren, demnach eine sichere Diagnose auf Atheromatose aus dem physikalischen Befunde nicht gemacht werden konnte und wahre Fälle von Gicht im Ganzen sehr selten vorkamen.

Einige der zur Beobachtung gekommenen Fälle will ich, weil sie mir hinsichtlich ihrer möglichen Entstehungsweise von besonderem Interesse zu sein scheinen, noch besonders erwähnen: Bei einem Hammerschmied, einem sehr hageren marastischen Manne von 40 Jahren, konnte hochgradige Atheromatose aller periph. Arterien und ein Aneurysma des arcus aortae nachgewiesen werden (funktionelle Anstrengung der Arterien?!);

ein anderer Fall betraf einen Schreiner von 48 Jahren, dessen Vater ein Potator (Bräumeister) war und im 40. Lebensjahr an Apoplexie, dessen Mutter im 28. Lebensjahre an Phtisis gestorben war; derselbe stand seit einem halben Jahre an rasch fortschreitender Tuberkulose der Lungen in Behandlung, zu der sich dann noch Gangrän des linken Fußes gesellte, was auf eine Vererbung beider Leiden hinweisen könnte. Der dritte Fall betrifft eine 37 jährige Frau, die seit 12 Jahren mit der Herstellung von Kupfer-Saiten beschäftigt war; dieselbe suchte wegen Atembeschwerden und Herzklopfen die medizinische Poliklinik auf und bot, außer den ausgesprochensten Symptomen der Atheromatose ganz das Bild der chronischen Kupfer-Vergiftung (die zwar manche Autoren überhaupt leugnen) dar: Eine tiefschwarze in's Grünliche stechende Farbe der Haare, grünliche Färbung des Zahnfleischrandes, allgemeine Muskelschwäche, tremor, sowie die Erscheinungen des chronischen Magen-Darmkatarrhes, so dass an einem Zusammenhange dieser beiden Zustände gedacht werden musste, zumal alle übrigen ätiologischen Momente für die Atheromatose in diesem Falle sicher ausgeschlossen werden konnten.

Leider konnte keiner der hier mitgeteilten Fälle durch die Obduktion kontrolliert werden, indem der größte Teil der Patienten, welche in poliklinischer Behandlung sind, der weiteren Beobachtung entgehen und auch von denen, welche der Krankheit erliegen, die Sektion ohne Zustimmung der Angehörigen, welche sehr oft nicht erteilt wird, nicht gemacht werden darf; so fand ich in den Sektionsberichten vom Jahre 1883 — nur 50 an der Zahl — keinen der von mir citirten jedoch 3 andere hieher gehörige Fälle, die ich in Kürze noch mitteilen will:

Der erste betraf einen Mann von 42 Jahren (Potator) der vor einem Jahre mit Oedem der Unterextremitäten erkrankt sein soll, wozu sich später Schwellung des Leibes und Atembeschwerden gesellten, so dass Patient genötigt war, seit dieser

Zeit stets das Bett zu hüten; die Sektion ergab der Hauptsache nach folgenden Befund: Herz vergrößert, beide Ventrikel dilatirt, Klappen gehörig, Epicard durchweg getrübt; im Verlauf der ganzen Aorta gleich über den Klappen beginnende hochgradige atheromatöse Veränderungen, beide Nieren klein, Oberfläche glatt, Kapsel leicht abziehbar, Gewebe normal; leichte Cirrhose der Leber, alte Pleuritis, chronische Peritonitis; in diesem Falle war die Ursache des Todes gewiss die durch die hochgradige Atheromatose bedingten Zirkulationsstörungen, welche als Folge des Potatoriums zu betrachten sind.

Der zweite Fall betraf einen Knaben von 15 Jahren. Derselbe war, nachdem er vorher schon öfter an Gelenk-Rheumatismus gelitten, plötzlich von heftigen Schmerzen am Handgelenke befallen worden, wozu sich die Symptome einer akuten Pericarditis gesellten, welcher Patient in einer Woche erlag; die Sektion ergab: Herzbeutel bedeutend verdickt; in demselben eine reichliche Menge heller seröser Flüssigkeit, Herz in allen Durchmessern bedeutend vergrößert, Epicard sammtartig getrübt, verdickt; Aorten und Pulmonalklappen nicht schlussfähig, verdickt, Endocard getrübt, sämtliche Herzhöhlen hypertrophisch und dilatirt; Aortenwandung stark getrübt und verdickt; es ist kaum zu bezweifeln, dass wir es hier mit dem Beginne des atheromatösen Processes zu thun haben.

Die dritte und ähnliche Beobachtung wurde bei einem an Phtisis pulm. verstorbenen Manne von 32 Jahren gemacht, der ebenfalls früher an Rheumatismus articul. gelitten hatte. Die Mitralklappen waren am Rande verdickt, auf den Aortenklappen und im bulbus aort. zeigte sich atheromatöse Verdichtung.

Ich bin mir wohl bewusst, dass durch so vereinzelte Beobachtungen noch nichts bewiesen wird, um daher der Behauptung, dass die Atheromatose bei uns wenigstens eine auch bei jüngeren Individuen gar nicht seltene Erkrankung ist, deren

Urfache in Zusammenhang mit Potatorium sowie mit chron. Herz- und Nierenerkrankungen, mit Rheumatismus und Gicht steht, mehr Grundlage zu geben, habe ich die Sektionsberichte des pathologischen Institutes dahier vom Jahre 1881 — 467 an der Zahl — und um diese auf 500 abzurunden, noch die letzten 33 Berichte des Jahrganges 1883 durchgesehen und aus der denselben entnommenen Statistik folgende Resultate erhalten.

Anm. Ehe ich auf dieselben eingehe, muß ich bemerken, daß unmöglich überall genau auf die Veränderung der Gefäßwände Acht genommen werden konnte und zumeist, wenn nicht besondere Veranlassung vorlag, nur der Befund an der Aorta und höchstens noch an den Gefäßen der Basis des Gehirnes in die Sectionsberichte aufgenommen wurde, so daß also sicher die erhaltenen Zahlen eher zu gering als zu hoch ausgefallen sein dürften, umsomehr als bei der Abfassung der Protokolle an eine Benützung derselben zu dem vorliegenden Zwecke nicht gedacht wurde.

Es betrafen von den 500 Sectionen 287 männliche und 213 weibliche Leichen; in 90 Fällen der ersteren und in 58 der letzteren also zusammen in 148 Fällen fanden sich Veränderungen an den Gefäßen, die hieher zu beziehen waren. In 352 Fällen (197 m. 155 w.) fanden sich entweder gar keine Anmerkungen bezüglich des Gefäß-Systems oder es war ausdrücklich bemerkt, daß die Gefäße normal waren und zwar fand ich diese Notiz bei 30 Männern und 28 Weibern über 50 Jahren.

Die 148 Fälle verteilen sich auf folgende Weise:

| zwischen                       | Männer | Weiber       |
|--------------------------------|--------|--------------|
| 10—19                          | —      | 1            |
| 20—29                          | 9      | 7            |
| 30—39                          | 10     | 4            |
| 40—49                          | 21     | 7            |
| 50—59                          | 19     | 13           |
| 60—69                          | 21     | 14           |
| 70—79                          | 8      | 9            |
| 80—89                          | 1      | 2            |
| Alter unbest. jedenf. ü. 40 J. | 1      | 1            |
|                                | 90 M.  | 58 W. = 148. |

Um ein Urtheil darüber zu erhalten, ob die beiden Geschlechter in verschiedenem Grade und in verschieden früher oder später Zeit von der Krankheit befallen waren, nahm ich 3 Grade der Krankheit an. Unter den ersten rechnete ich die Fälle, bei denen es im Sectionsprotokolle hiefs: Stellenweise fleckige Trübung und Verdichtung; unter den zweiten die Bezeichnungen: stark fleckige Trübung und Verdickung oder: vereinzelte kalkige Excrecenzen oder: mäfsige Atheromatose; alle weiter vorgeschrittenen Fälle wurden dem dritten Grade beigezählt. Es ergab sich hiebei

|        | I. Grad | II. Grad | III. Grad |
|--------|---------|----------|-----------|
| Männer | 34      | 23       | 33        |
| Weiber | 21      | 20       | 17        |

Davon hatten das 40. Lebensjahr noch nicht erreicht

|        | I. Grad | II. Grad | III. Grad |
|--------|---------|----------|-----------|
| Männer | 12      | 4        | 5         |
| Weiber | 7       | 4        | 1         |

Es ergibt sich auch hieraus wieder, dafs beide Geschlechter in verhältnifsmäfsig gleicher Zahl erkrankten, dafs jedoch die Erkrankung beim männlichen Geschlechte durchschnittlich früher vorkommt und in höherem Grade sich also wahrscheinlich auch schneller entwickelt.

Der jüngste Fall betraf ein 14jähriges Mädchen die an einer fibropurulenten Pericarditis starb und bei der sich auf den Semilunarklappen atheromatöse Veränderungen fanden.

In 27 Fällen (16 m. 11 w.) mußte die Atheromatose direkt als die Todesursache angenommen werden und verteilen sich dieselben folgender Maassen:

| zw.              | Männer    | Weiber      |
|------------------|-----------|-------------|
| 30—39            | 1         | —           |
| 40—49            | 1         | —           |
| 50—59            | 4         | 2           |
| 60—69            | 7         | 3           |
| 70—78            | 2         | 4           |
| 80—89            | —         | 1           |
| Alter unbestimmt | 1         | 1           |
| Summa            | 16 Männer | 11 W. = 27. |

Auch hier wieder das gleiche Resultat!

Der jüngste Fall betraf einen Mann von 35 Jahren, die Leichendiagnose lautete: Apoplexia cerebri Hochgradigste Atheromatose aller Arterien, Cor bovinum.

Sehr oft bestanden zugleich Herz- und Nierenkrankheiten so daß an einem Zusammenhang nicht gezweifelt werden kann. Herzerkrankungen, die als hierher gehörig betrachtet werden dürfen, (Altersatrophie, Cor adiposum bei allgem. Adipositas, angeborene Herzfehler, Sehnenflecke u. dgl. sind nicht mit eingerechnet) fanden sich bei 69 Individuen (43 M. 26 W.) und zwar verteilen sich die verschiedenen Herzerkrankungen wie folgt:

|                                       | Männer | Weiber |
|---------------------------------------|--------|--------|
| ausgepr. Hyptr. bes. d. l. V. . . . . | 25     | 16     |
| Myodegeneratio . . . . .              | 14     | 4      |
| Endocarditis . . . . .                | 13     | 9      |
| Myocarditis . . . . .                 | 8      | 5      |
| Pericarditis . . . . .                | 2      | 2      |

In dieser Zusammenstellung muß uns das unverhältnismäßig häufige Vorkommen der Myodegeneration bei Männern auffallen. 8mal bestand dieselbe neben der Hypertrophie 4mal für sich allein und 2mal mit Stenose der Aorta dies hängt damit zusammen, daß die Atheromatose bei Männern wie gesagt in höherem Grade getroffen wird, demnach auch die Folgen derselben: Hypertrophie und später Degeneration, häufiger sein müssen. Die übrigen Formen der Herzerkrankungen waren bei den verschiedenen Individuen in verschiedenster Weise combinirt, was jedoch hier nicht in Betracht kommt.

Complication mit Nierenerkrankungen (verschiedene Grade und Formen des M. Bright.) fand sich bei 59 Individuen (37 M. 22 W.) und von diesen waren 38 Fälle (29 M. 9 W.) mit Herzerkrankung combinirt. 19mal fand ich Hydrops (12 m. 7 w.) je einmal bei Männern und Weibern ohne gleichzeitige Herzerkrankung. 28mal (19 m. 9 w.) bestand neben

der Herz- und Nierenerkrankung Veränderungen der Leber (verschiedene Grade und Formen der Cirrhose), in 10 Fällen von Atheromatose (blos Männer) bestanden dieselben ohne gleichzeitige Herz- und Nierenerkrankung, was wieder auf das Potatorium als ätiologisches Moment hinweist, denn daß dieses die häufigste Ursache der interstitiellen Hepatitis, wird heut zu Tage kaum noch bezweifelt werden. 28 Fälle betrafen Phtisiker (22 m. 6 w.) oder sehr anämische herabgekommene Individuen, bei 13 derselben (10 m. 3 w.) waren die Veränderungen leichten Grades, so daß wir es zum Teil vielleicht nur mit einfacher Fettdegeneration hier zu thun haben, bei den übrigen 15 (12 m. 3 w.) jedoch waren in den Sectionsberichten ausdrücklich die Worte »atheromatöse Veränderungen« gebraucht und habe ich dies deshalb eigens erwähnt, weil wir in so vielen älteren Lehrbüchern lesen: Die Atheromatose verhalte sich ausschließlich gegen Phtisis.

Apoplexie fand ich verhältnismäßig selten, nämlich frische apoplectische Heerde 8 mal (4 M. 4 W.), ältere apopl. Heerde 6 mal (4 M. 2 W.) 3 dieser Fälle kamen in jüngeren Jahren vor und betraf der eine den schon erwähnten 35 jährigen Mann, der zweite einen erst 39 Jahre alten Maler, der dritte eine 48 Jahre alte Frau; die übrigen gehörten dem vorgedrückten Lebensalter an.

Wenn wir die Erkrankungen des Herzens und Gefäßsystems einerseits, und die des uropoëtischen und Circulationsapparates andererseits, als nicht von einander abhängig, sondern als den Effect einer gemeinsamen Ursache betrachten wollten, wie dies aus der häufigen Coincidenz der genannten Sytemerkrankungen zu erschliessen wäre, so müßten wir dennoch den chron. Alkoholismus, Rheumatismus und Gicht als die häufigsten Ursachen derselben annehmen, denn wie die Erfahrung lehrt, sind ja die meisten Erkrankungen des Herzens, sofern sie nicht angeboren sind, als Folgen der zwei erstgenannten Ursachen zu betrachten und ebenso gewiß ist

es, daß Gicht und Nierenkrankheiten in ätiologischer Beziehung zusammengehören; daß wir es möglicher Weise mit einer allgemeinen Ernährungsstörung zu thun haben, darauf könnte uns auch die Häufigkeit der gleichzeitigen Lebererkrankungen hinweisen.

Für die übrigen ätiologischen Momente konnten wir aus den angegebenen Sectionsberichten keine Stütze gewinnen; es sind so ziemlich alle Stände in gleicher Weise vertreten, so daß sich von der Beschäftigungsweise kein deutliches Abhängigkeits-Verhältniß ergibt, wenn auch einzelne Beobachtungen darauf hinzuweisen scheinen.

Nach den gegebenen Auseinandersetzungen resumiren wir die über die Pathogenese und Aetiologie der Atheromatose gemachten Erfahrungen in folgenden Sätzen:

Die Atheromatose ist eine vorwiegend dem höheren Lebensalter angehörige, jedoch auch in jugendlichen und mittleren Jahren nicht so seltene Erkrankung der Gefäßwände, welche ihren Ausgangspunkt in den tieferen Schichten der Intima nimmt und auf einer hypertrophischen Wucherung des Bindegewebes derselben (Arteriosclerose) beruht. Diese ist entweder die Folge einer parenchymatösen Entzündung (Virchow) oder einer durch Verlangsamung der Blutbewegung begünstigten Einwanderung farbloser Blutkörperchen in die Intima (Traube), oder man kann sie zum Teil als Hypertrophie zum Teil als chron. Entzündung auffassen (Koster), oder endlich als secundär fortgeleitet von einer chronischen Mesarteritis (Koefer).

Die Ursache der Erkrankung ist eine entweder ererbte (angeborene) oder erworbene Disposition und kommen hinsichtlich letzterer für die jüngeren und mittleren Lebensjahre hauptsächlich der chronische Alkoholismus, Rheumatismus und Gicht, für das häufige Vorkommen in älteren Jahren der Involutionsproceß als ätiologisches Moment in Betracht.

Zum Schlusse erübrigt mir noch, Herrn Professor Bollinger, durch dessen gütige Ueberlassung des Materials vom hiesigen pathologischen Institute es mir allein ermöglicht wurde, die Arbeit in vorliegender Weise zu vollenden, meinen aufrichtigsten Dank auszusprechen.



